

هالوپریدول-سبحان

نام ژنرویک: هالوپریدول

شکل دارویی: قرص خاک

دار و درک اعلاءات ذبل سیار سودمند می‌باشد. اگر به نکتهای شما مفهوم برخورد کردید، بیا سه

اطلاعات پیشتری در مورد این دارو باز از داربی به پوشک با دوسن خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو

نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماران فعالی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف این در موارد

شایان با توجهی ممکن است این دارو را با خوشی شروع نمایید و با برسی

و ضمیمه قدر مقدار دارو را باز نمایید. در مورد هالوپریدول مواد دلیل باید در نظر گرفته شود:

فایده حاصل از مصرف دارو را در سنجیده شود.

موارد منع مصرف:

در سوزنکه ساقه هر گونه و اکتش غیرعادی با آلتیک به داروی هالوپریدول داریز و همچنین در صورت

داشت حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد تکنیدارنده را نگاه، به پوشک خود اطلاع دهید. مواد

منع مصرف این دارو شناسنامه ای داشتند. اکتش افزایش حساسیت به هالوپریدول با سایر محضیات

دارو-حالات اعماق اکتش شدید سطح هوش ای افراد مبتلا می‌باشند: اکتش افزایش حساسیت به هالوپریدول (ایمی) بیماری

پارکسون-سازندهای قلبی مانند رتم قلبی نامنظم (ایمی) و با کاهش ضربان قلب (ایمی کارڈی) بیماری

سیستم اعصاب مرکزی که هسته های قاعده ای مغز (بالا) کانکلکی) را درگیر می کند افت سطح پیامبر خون

کنترل شده (هیپوکالمی)

حاملگر:

در سوزنکه ساقه هر گونه و اکتش غیرعادی با آلتیک به داروی هالوپریدول داریز و همچنین در صورت

ماهه اخر برای داروی دارند. این دارو شناسنامه ای داشت منجر به علامتی مانند شفافیت، لرزش، سفتی عضلات، خواب آلوگی، بی قراری،

مشکلات تنفسی و یا باید در نوزاد گرد.

شیردهی:

در سوزنکه که در نوزاد شیردهی به سر می برد، قبل از مصرف دارو با پوشک خود مشورت کنید. مادرانی که

این دارو از مصرف می نمایند، تابستانی به فرزند خود شیر دهنند.

سالمدنان:

صرف دارو در سالمدنان مک مشکلات حافظه دارند ای باستی به دوسن پوشک باشد، زیرا مصرف این احتمال بروز

عارض جانی خاصی را افزایش می دهد. پژوهشکن ممکن است دارو را با دوز کمتری شروع نماید و با برسی

و ضعیف فرد به مرور مقدار مصرف دارو را افزایش دهد.

صرف همراه با سایر داروهای:

اگر همان می باشی این دارو، هر داروی خنی داروهای بدون نسخه، گیاهی با غذایی را مصرف

کنید با خود رسانید و بیرون می دهد. پژوهشکن ممکن است دارو را با دوز کمتری شروع نماید و با برسی

و ضعیف فرد به مرور مقدار مصرف دارو را افزایش دهد.

صرف همراه با سایر داروهای:

اگر همان می باشی این دارو، هر داروی خنی داروهای بدون نسخه، گیاهی با غذایی را مصرف

کنید با خود رسانید و بیرون می دهد. پژوهشکن ممکن است دارو را با دوز کمتری شروع نماید و با برسی

و ضعیف فرد به مرور مقدار مصرف دارو را افزایش دهد.

صرف هالوپریدول با داروهای زیر بهرهزی نمایند:

• اروهای بر ضایای (کلینین، نورومیرام، روپانین، آسید، امودارون، سوتاولو و سا دوفیلید) - خنک

• افسردو (سیستولوپرام و اس سیستولوپرام) - انتی-سیستولوپرام، پریفرازین، پیموزاپس، تسری

• فالونوکازن، فارنیستون و بیزپریدین - انتی-نورومیرامین، کلارتروپوسین، ایزو-ویوسین

• لوکوفلکوسین، اسکیفولاکوسین و تیلتروپوسین - خد قارچ (بناتانین) - خد مالاز (هواپاتنین) - خند

• تیغ (دلتاروسین) - خد سطران (هولوسین) - خد ایزومین و ایزاتین

• صرف هالوپریدول همراه با پیش متنم فرد دارد و اگر عوارض جانبی زیر بروز نمود، صرف هر

دو دارو اقطع و با پوشک خود مشورت کنید.

• بی غیر قابل توجهی - حرکات غیر قابل کنترل - گیجی - عدم اگاهی - سردرد - عدم تعادل - خواب آلوگی

• داروهای که هالوپریدول بر عملکرد آنها اثر می کنند:

• ایام بخش ها - مسکن های قوی - خد اسپریدگر های سه حلقوه ای - خد شارخون (گوکتیندین و متل دوبای)

• امدادنیان - داروهای مرکب مورد استفاده در بیش فعالی و کم توجهی - خد بارکتینسون (لوودوسیا) - داروهای

رقق کننده خون (فندتینین) -

• اروهای که بر عملکرد هالوپریدول تاثیر می کارند:

• ایبرالوم و بیوسپرینو - انت اسپرول - گولوکتین، فلوكستین، فلوكسامین، نفاذون، باروکستین، سرتزالین

و ولاتکسین، بیوسپرینو و گاه علف چای (خد اسپریدگر) - کاراپازین، فنسی توئین و فوریبارتال (خد صرع)

• رفاظینین (انتی بیوتیک) - کوکوکاتزول، اینراکتازول، پوساکوتازول و اریکوتازول (خد قارچ) - ایندیباتر،

رنتوواپر و ساکوتازول (خد بیرون) - کلریپروزان و بیرونیازین (خد تهوع و استقران) - ورابامیسل (خد فشار

خون)

سایر بیماریهای:

حضر سایر بیماریها و مشکلات پژوهشکی می تواند مصرف هالوپریدول را تحت تأثیر قرار دهد. مطمتن شود که

هر گونه مشکل پژوهشکی دیگر خود مخصوصاً مواد آمده در ذبل را به پوشک خود اطلاع دهد:

• سایه خصیص با اتوکلیمی کماری - قلب و یا قوه ایگانیزیز نزدیکان به دلیل مشکلات قلبی - میله خونزیری

مجزی و گرد و عوامل ساعدت داری باز مسکن های مغزی - اختلالات التکنولیل (مالح خون) - مشکلات کبدی و

یا کلری - صرع (تشنج) - مسدیه - اختلالات غدد تیره - میرزی - اکتیزت مصرف مرکزی غده فوق کلیسوی

(فکوروموسومتا) - کاهش سطح پیامبر ای این میزغم خون - افزایش سطح پیامبر ای این دارو

روشن مصرف مناسب این دارو:

• دارو را دقیقاً طبق دستور پژوهشکن مصرف نمایید و در صورت هر گونه شیوه سایرها با پوشک سا دوسن خود

مشورت کنید. این دارو را یک بیوان آب میل نمایید. از مصرف ترکیبات الکلی در دوره درمان خودداری نمایید.

اگر قطعه مصرف دارو بدون دستور پژوهشکن خودداری نمایید. پژوهشکن مقدار مصرف دارو را با توجه به مورد مصرف، سیز و ضعیف بیماری تعین می کند و سالمدان و افرادی که مشکلات کبدی پیش از مصرف دارو را باز خواهند داشتند.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

از مصرف دارو باید از مصرف دارو باز نمایید.

تهران، خیابان دکتر طباطبی غربی، شماره ۲۹، کد پستی ۱۴۱۸۰-۵۳۶۹۵

تلنگ رسیدگی به شکایات: (۰۱۳) ۳۱۸۴۳۶۱۹

ایمیل: Complaints@sobhandarou.com