



آلرانتین

نام ژنریک: مانتن

شکل دارویی: قرص روکش دار خطاوار

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما بسیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌ای نامفهوم رخواود کردید یا به اطلاعات پیشتری در مورد این دارو نیاز دارد بپوشک با داروساز خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در تضمین گیری برای مصرف یک دارو باید خطرات آن در مقابل فواید حاصل از مصرف دارو سنجیده شود. در مورد الانتین موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

موارد منع مصرف:

در صورتیکه سایقه هر گونه واکنش غیرعادی یا آلرژیک به داروی مانتنین دارید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پوشک خود اطلاع دهید. منع مصرف این دارو شامل واکنش افزایش حساسیت به مانتنین و یا مواد جانبی موجود در قرص می‌باشد.

حاملگی:

در صورت بارداری یا قصد باردار شدن، قبل از مصرف دارو با پوشک یا داروساز خود مشورت نمایید. زیرا مصرف این دارو در طی بارداری تنشه داشت.

شیردهی:

در صورتیکه که در دوره شیردهی به سر می‌برید، قبل از مصرف دارو به پوشک یا داروساز خود مشورت کنید. مادرانی که این دارو را مصرف می‌نمایند، نبایستی به فرزند خود شیردهند.

اطفال:

این دارو برای سنین زیر ۱۸ سال توصیه شده است.

صرف همراه با سایر داروهای:

اگر هم‌مان با این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتمانی یا غذایی را مصرف می‌کنید یا اخیراً مصرف کرده اید، به پوشک یا داروساز اطلاع دهید. مخصوصاً همین است که پوشک شما از صرف داروهای زیر اطلاع داشته باشد:

امانات‌ایران، کتابخانه و دکسترومنورافن سبب تشدید عوارض سیستم عصبی می‌شوند. دانترولن و باکوفن مسایم‌تیدین، رایتیدین، پروکاتین امید، کیدین، نیتین و نیکوتین هیلریکلریزیک سبب تشدید یوسوت می‌شوند. جاریتیوراتها (مانند فنورایتیال) سبب تشدید خواص الودگی و تضییف سیستم عصبی در بدن می‌گردند. داروهای دوبایتینزیک (مانند لوودوبا و برومکربیتین) منورولیتیکها (جهت درمان مشکلات اعصاب و روان (مانند کوتیاپین، اربیپرازول، رسپریدون، الترایپن و کلوزاین) داروهای ضد صرع (مانند اتفاقهای خوراکی (مانند وارفارین) داروهای قلایی کننده ادار مانند مهار کننده‌های کربنیک آنهردراز (مانند استازول‌امید) و بی‌کربنات سدیم).

سایر بیماریهای:

حضور سایر بیماریها و مشکلات پیشکشی می‌تواند مصرف مانتنین را تحت تأثیر قرار دهد. مطمئن شوید که هر گونه مشکل پیشکشی دیگر خود مخصوصاً موارد آمده در ذیل را به پوشک خود اطلاع دهید:

• ساقه بیماری صرع وجود حملات قلبی (افارکتوس قلبی)، نارسایی اختناقی قلب و یا فشار خون بالا. نارسایی کلیسوی

روشن مصرف مناسب این دارو:

دارو را دقیقاً طبق دستور پیشکشان مصرف نمایید و در صورت هر گونه شبهه یا پیشکش یا داروساز خود مشورت کنید. هر روز در زمان مشخص دارو را با یک لیوان آب میل نمایید. این دارو را می‌توان همراه با غذا و یا با شکم خالی مصرف نمود. در بیمارانی که نارسایی کلیه دارند ممکن است پوشک با توجه به شدت بیماری دوز دارو را تنظیم نماید. لذا پایش عملکرد کلیه توسط پوشک لازم می‌باشد. همچنین این دارو را طوره درمان توصیه شده مصرف نمایید تا از می‌ایران آن بهره ماند شوید و جهت ازیزی روند درمان، مراجعت منظم به پوشک خود را هرگز فراموش نکنید.

دوز فراموش شده:

اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، از مصرف دوز فراموش شده منصرف شوید و به رژیم نظمی قلبی برگردید. هرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید.

صرف بیش از حد:

صرف بیش از حد دارو ممکن است سبب افزایش بروز عوارض جانبی گردد و در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده به پوشک یا مرکز درمانی مراجعت نمایید.

هشدارها و احتیاطات:

هزاریم گیاه خواری، اسیدیوز توپلهای کلیوی، نارسایی کلیه و عفونتهای ادراری سبب کندی دفع دارو از بدن می‌گردند، لذا در صورت بروز موارد ذکر شده با پوشک خود مشورت کنید.

ماین دارو ممکن است سبب خواب آسودگی و سرگیجه گردد، لذا برای رانتنگی و کار با ابزارآلات یا پیشک خود مشورت کنید.

از مصرف این دارو با سایر داروهای مهار کننده گیرینده‌های گلواتمات مانند آمانات‌ایران (جهت درمان پارکینسون)، کامین (داروی بیهوشی) و دکسترومتوفان (جهت درمان سرفه) خودداری نمایید.

عارض جانبی:

هر دارو در کنار اثرات مفید خود دارای یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد. اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی‌کند اما در صورت بروز همه مشکلی به پوشک خود مراجعت کنید. عوارض جانبی این دارو با اکاسی از آن و مشورت با پیشک قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها به مررت اکثر از عوارض عدم مصرف آنها می‌باشد.

عارض جانبی شایع (با شیوع یک تا ده مورد از یکصد نفر): سرد، خواب آسودگی، یوسوت، افزایش ازیزیهای عملکرد کبدی، سرگیجه، اختلال در تعادل، تنگی تنفس (کوتاهی تنفس) و افزایش فشار خون.

نیازی به نگرانی از لیست عوارض دکر شده در مورد این دارو نیست و اکثریت مردم این دارو را بدون هیچ مشکل مصرف می‌کنند.

عارض دیگری که در بالا نیامده است ممکن است در برخی از بیماران روزگاری کنند لذا اگر متوجه عوارض جانبی دیگری شدید به پوشک خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دارو از نور و رطوبت و دور از دید و دسترس افلکمال نگهداری شود.

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دکتر قاطمی غربی، شماره ۲۹۵، کد پستی ۱۴۱۱۸-۵۳۶۹۵

تلفن رسیدگی به شکایات: (۰۱۳)۳۱۸۳۶۱۹

ایمیل: Complaints@sobhandarou.com