

هالوپریدول

نام ژنتیک: هالوپریدول

شکل دارویی: قطره خوراکی

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما بسیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌ای نامفهوم برخورد کردید یا به اطلاعات بیشتری در مورد این دارو نیاز دارید یا پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در تصمیم‌گیری برای مصرف یک دارو باید خطرات آن در مقابل فواید حاصل از مصرف دارو سنجیده شود. در مورد هالوپریدول موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

موارد منع مصرف:

در صورتیکه سابقه هر گونه واکنش غیرعادی یا آلرژیک به داروی هالوپریدول دارید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزشک خود اطلاع دهید. موارد منع مصرف این دارو شامل موارد ذیل می‌باشند: • واکنش افزایش حساسیت به هالوپریدول یا سایر محتویات دارو • حالت اغما (کاهش شدید سطح هوشیاری همراه با سببهای ضعیف به محرکهای محیطی) • بیماری پارکینسون • بیماریهای قلبی مانند رقیق قلبی نامنظم (آریتمی) و یا کاهش ضربان قلب (برادی کاردی) • بیماری سیستم اعصاب مرکزی که هسته های قاعده ای مفرز (بازال گانگلیا) را درگیر می‌کند • افت سطح پتاسیم خون کنترل نشده (هیپوکالمی)

حاملگی:

در صورت بارداری و یا قصد باردار شدن قبل از مصرف دارو، با پزشک مشورت نمایید. مصرف این دارو در سه ماهه آخر بارداری ممکن است منجر به علائمی مانند ضعف، لرزش، سفتی عضلات، خواب آلودگی، بی‌قراری، مشکلات تنفسی و یا بلع در نوزاد گردد.

شیردهی:

در صورتی که در دوره شیردهی به سر می‌برید، قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید. ماداری که این دارو را مصرف می‌نماید، نیابتی به فرزند خود شیر دهند.

سالمندان:

مصرف دارو در سالمندان که مشکلات حافظه دارند بایستی با دستور پزشک باشد، زیرا مصرف آن احتمال بروز عوارض جانبی خاصی را افزایش می‌دهد. پزشکان ممکن است دارو را با دوز کمتری شروع نماید و با بررسی وضعیت فرد به مرور مقدار مصرفی دارو را افزایش دهد.

مصرف همراه با سایر داروها:

اگر همزمان با این دارو، هر دارویی چنانچه دارای بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی یا غذایی را مصرف می‌کنید یا اخیراً مصرف کرده اید، به پزشک یا داروساز اطلاع دهید. خصوصاً مهم است که پزشکتان شما از مصرف داروهای زیر اطلاع داشته باشد:

- مصرف هالوپریدول با داروهای زیر پرهیز نمایید:
- داروهای موثر بر ضربان قلب (کتینیدین، دیژوپرامید، پروکائین آمید، امبودول، سوتالول و یا دوفتیلید) • ضد افسردگی (سیتالیپرام و ام سیتالیپرام) • آنتی‌سایکوتیکها (فلوفنازین، پروفنازین، پیموزاید، تری فلوپروزین، سرتیندول و زیراسیدون) • آنتی بیوتیکها (آزیترومایسین، کلاریترومایسین، اریترومایسین، فلوفلوکساسین، ماکسیفلوکساسین و تلتروتومایسین) • ضد قارچ (پنتامیدین) • ضد مالاریا (هالوفانتین) • ضد تیوع (دولستران) • ضد سرطان (تورمیفن و واندانتاپ)

■ مصرف هالوپریدول همراه با لیتیم نیاز به پایش منظم فرد دارد و اگر عوارض جانبی زیر بروز نمود، مصرف هر دو دارو را قطع و با پزشک خود مشورت کنید:

- تب غیر قابل توجه • حرکات غیر قابل کنترل
- داروهای که هالوپریدول بر عملکرد آنها اثر می‌گذارد:
- آرام بخش ها • مسکن های قوی • ضد افسردگی های سه حلقه ای • ضد فشار خون (گوانتیدین و متیل دوبا) • آندرانول • داروهای محرک مورد استفاده در بیش فعالی و کم توجهی • ضد پارکینسون (لوودوبا) • داروهای رقیق کننده خون (فینیدینون)

- داروهای که بر عملکرد هالوپریدول تاثیر می‌گذراند:
- البرازولام و بوپروپیون (ضد اضطراب) • دولوکستین، فلوکستین، فلوکسامین، نفلزادون، پاروکستین، سرتالین، ونلافاکسین، بوپروپیون و گیاه علف های (ضد افسردگی) • کاربامازپین، فنی توئین و فنیوتالیتال (ضد سرع) • ریفامپین (آنتی بیوتیک) • متوکواترول، ایتراکواترول، بوساکواترول و وارینکواترول (ضد قارچ) • ایندیناپور، ریتوناویر و ساکونتاویر (ضد ویروس) • کلرپرومازین و پرومتازین (ضد تهوع و استفراغ) • وراپامیل (ضد فشار خون)

سایر بیماریها:

خضور سایر بیماریها و مشکلات پزشکی می‌تواند مصرف هالوپریدول را تحت تأثیر قرار دهد. مطمئن شوید که هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود مشخص موارد آمده در ذیل را به پزشک خود اطلاع دهید:

- سابقه شخصی یا خانوادگی بیماری قلبی و یا فوت ناگهانی نزدیکان به دلیل مشکلات قلبی
- سابقه خونریزی منزی یا وجود عوامل مساعد کننده برای سکنه منزی • اختلالات الکترولیتی (املاح خون) • مشکلات کبدی و کلیوی • سرع (تنشج) • افسردگی • اختلالات غده تیروئید • پرکاری قسمت مرکزی غده فوق کلیوی (فئوکروموسیتوما) • کاهش سطح پتاسیم یا منیزیم خون • افزایش سطح پرولاکتین

روش مصرف مناسب این دارو:

دارو را دقیق طبق دستور پزشکتان مصرف نمایید و در صورت هر گونه شبهه یا پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. • این دارو را می‌توانید همراه با غذا و یا بعداً خالی مصرف کنید. • از مصرف ترکیبات الکلی در دوره درمان خودداری نمایید. • از قطع مصرف دارو بدون دستور پزشک خودداری نمایید. • پزشکتان مقدار مصرف دارو را با توجه به مورد مصرف، سن و وضعیت بیماری تعیین می‌کند و در سالمندان و افرادی که مشکلات کلیوی یا کبدی دارند، دوز کمتری توصیه شده است. • پزشکتان ممکن است این دارو را با دوز کمتری شروع نماید و با بررسی وضعیت فرد مقدار داروی مصرفی را به مرور افزایش دهد.

دوز فراموش شده:

اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، از مصرف دوز فراموش شده مصرف شده و به رژیم منظم قبلی برگردید. هرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید.

مصرف بیش از حد:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

هشدار ها و احتیاطات:

- در سالمندان و یا افرادی که به اثرات این دارو بسیار حساس می‌باشند، مصرف دارو بایستی با احتیاط انجام گردد.
- در صورتی که سابقه شخصی و یا خانوادگی لخته خون دارید، مصرف دارو بایستی با احتیاط صورت گیرد.
- از مصرف ترکیبات حاوی الکل خودداری نمایید، زیرا سبب تشدید خواب آلودگی و کاهش هوشیاری می‌گردد.
- اگر از اختلالات حافظه رنج می‌برید، حتماً قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید.
- مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی و عدم تعادل گردد. در صورت بروز این علائم از رانندگی و کار با ابزارآلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- پزشکتان ممکن است قبل یا طی درمان وضعیت الکتریکی قلب شما را بررسی نماید (نوار الکتریکی قلب ECG).

• پزشکتان ممکن است سطح خونی الکترولیتها (املاح) شما را نیز بررسی نماید.

• در سالمندانی که مشکلات حافظه (ماناس) دارند و داروهای نوتروپلیتیک مانند هالوپریدول مصرف می‌کنند، ریسک مرگ و میر توجه نشده اندکی نسبت به افرادی که این دارو را مصرف نمی‌کنند بیشتر است.

عوارض جانبی:

هر دارو در کنار اثرات مفید خود دارای یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد. اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی‌کند اما در صورت بروز هر مشکلی به پزشک خود مراجعه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از آن و مشورت با پزشک قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها به‌یادآید کمتر از عوارض عدم مصرف آنها می‌باشد.

- اگر هر یک از عوارض جانبی نامیاع و جدی زیر در شما بروز کرد و یا احتمال دادید که بروز نموده است، ممکن است نیاز به مداخله پزشکی داشته باشید لذا فوراً با پزشک خود مشورت کنید:
- لخته‌های خونی به ویژه در وریدهای پا (که با تورم، درد و قرمزی پا همراه است) • تورم ناگهانی صورت، زبان، گلو یا گردن؛ کپهر، التهابات شدید پوستی اعم از قرمزی و تاول زدن پوست که با خارش همراه است، ممکن است نشانه‌ای از واکنش افزایش حساسیت به دارو باشد • سندرم نوتروپلیتیک بدخیم که ممکن است منجر به علائمی مانند افزایش ضربان قلب، تغییرات فشار خون، تب به دنبال تعریق؛ اشکال در تنفس، سفتی عضلات، کاهش موثر بر ضربان قلب (کتینیدین، دیژوپرامید، پروکائین آمید، امبودول، سوتالول و یا دوفتیلید) • ضد افسردگی (سیتالیپرام و ام سیتالیپرام) • آنتی‌سایکوتیکها (فلوفنازین، پروفنازین، پیموزاید، تری فلوپروزین، سرتیندول و زیراسیدون) • آنتی بیوتیکها (آزیترومایسین، کلاریترومایسین، اریترومایسین، فلوفلوکساسین، ماکسیفلوکساسین و تلتروتومایسین) • ضد قارچ (پنتامیدین) • ضد مالاریا (هالوفانتین) • ضد تیوع (دولستران) • ضد سرطان (تورمیفن و واندانتاپ)

■ در صورت بروز عوارض جانبی زیر با پزشک یا پرستار خود مشورت کنید:

- عوارض جانبی شایعتر: بی‌قراری، مشکلات خواب، سردرد، هذیان، توهم، افسردگی، احساس سرگیجه حین تغییر وضعیت • کاهش خواب آلودگی، حرکات غیر طبیعی و سریع چشمها، تاری دید، کاهش فشار خون، تهوع، استفراغ، بیوس، خشکی دهان یا افزایش بزاق دهان، راش پوستی، مشکلات در دفع ادرار، ناتوانی جنسی، افزایش یا کاهش وزن، تغییرات آئزیمهای کبدی
- عوارض جانبی نامشایع: کاهش گلیوسای سفید و یا پلاکت، گیجی، کاهش میل جنسی، تشنج، سفتی عضلات و مفاصل، اسهال، مشکلات در راه رفتن، تشنهای کوتاه، زردی پوست یا چشمها و تیرگی ادرار یا روشن شدن رنگ مدفوع (علامت التهاب کبد)، افزایش حساسیت به نور خورشید، خارش، افزایش تعریق، تغییرات در قطع عادت ماهیانه، رشح غیر طبیعی شیر • یا درد سینه ها، تب و تورم ناشی از افزایش تولید مایعات در بدن
- نیازی به نگرانی از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثریت موارد این دارو را بدون هیچ مشکلی مصرف می‌کنند.
- عوارض دیگری که در بالا نامیده است ممکن است در برخی از بیماران بروز کنند لذا اگر متوجه عوارض جانبی دیگری شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

دارو را درین جبهه (دور از نور) و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. همچنین دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.

دفعتر مرتبی:

تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره ۳۹۵ ، کد پستی ۵۳۴۶۹-۱۳۱۱۸
تلفن رسیدگی به شکایات: ۰۲۱۳۸۸۴۶۹ (۰۱۳)

ایمیل: Complants@sobhandarou.com