

نام ژنریک: سیتاگلیپتین

شکل دارویی: قرص روکش دار خا دراز

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما بسیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌ای نامفهوم برخورد کردید یا به اطلاعات بیشتری در مورد این دارو نیاز دارید با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در تصمیم‌گیری برای مصرف یک دارو باید خطرات آن در مقابل فواید حاصل از مصرف دارو سنجیده شود. در مورد ژانوفتین موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

موارد منع مصرف:

در صورتی که سابقه هر گونه واکنش غیرعادی یا آلرژیک به داروی سیتاگلیپتین دارید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزشک خود اطلاع دهید. موارد منع مصرف این دارو شامل موارد ذیل می‌باشند: •واکنش افزایش حساسیت به سیتاگلیپتین یا سایر محتویات دارو.

حاملگی:

در صورت بارداری یا قصد بارداری شدن، قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. زیرا مصرف این دارو در طی بارداری توصیه نشده است.

شیردهی:

ترشح دارو در شیر مادر و اثر آن بر شیرخوار نامشخص است لذا نیاستی این دارو را در دوره شیردهی مصرف نمود.

اطفال:

ایمنی و اثربخشی دارو برای سنین زیر ۱۸ سال به اثبات نرسیده است لذا مصرف آن در اطفال توصیه نشده است.

مصرف همراه با سایر داروها:

اگر همزمان با این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی یا غذایی را مصرف می‌کنید یا اخیراً مصرف کرده اید، به پزشک یا داروساز اطلاع دهید. مخصوصاً مهم است که پزشک شما از مصرف داروهای زیر اطلاع داشته باشد زیرا ممکن است نیاز به تنظیم مجدد دوز مصرفی دارو باشد:

- ممکن است سیتاگلیپتین غلظت خوبی دیگوسین را اندکی افزایش می‌دهد لذا ارزیابی دیگوسین حین درمان توصیه می‌گردد.
- مصرف همزمان سایر داروهای ضد دیابت (مانند انسولین و گلی بنکلامید) احتمال بروز افت قند خون (هیپوگلیسمی) را افزایش می‌دهد لذا ممکن است نیاز به کاهش دوز سایر داروهای ضد دیابت باشد.
- مصرف همزمان کلاریتروماسین احتمال بروز افت قند خون را افزایش می‌دهد.

سایر بیماریها:

حضور سایر بیماریها و مشکلات پزشکی می‌تواند مصرف سیتاگلیپتین را تحت تأثیر قرار دهد. مطمئن شوید که هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود مخصوصاً موارد آمده در ذیل را به پزشک خود اطلاع دهید:

- پانکراتیت (تهاب پانکراس یا لوزالمعده) • سنگ کیسه صفرا، وابستگی به الکل و افزایش شدید تری گلیسرید (نوعی چربی خون) احتمال بروز پانکراتیت را افزایش می‌دهد • کتواسیدوز دیابتی (عارضه از دیابت که با قند خون بالا، کاهش سریع وزن و تهوع و استفراغ همراه است) • نارسایی کلیه و یا سابقه آن • سابقه واکنش حساسیتی به سیتاگلیپتین

روش مصرف مناسب این دارو:

- دارو را دقیقاً طبق دستور پزشکتان مصرف نمایید و در صورت هر گونه شبهه با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
 - اگر مشکلات کلیوی دارید، ممکن است پزشکتان دوز کمتری را تجویز نماید.
 - این دارو را می‌توانید همراه با غذا یا نوشیدنی و یا بدون آن مصرف کنید.
 - ممکن است پزشکتان این دارو را به تنهایی و یا همراه با سایر داروهای کاهنده قند خون تجویز نماید.
- ### دوز فراموش شده:

اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، آنرا مصرف نمایید. با اینحال اگر نزدیک زمان دوز بعدی به یاد آوردید، از مصرف دوز فراموش شده منصرف شوید و به رژیم منظم قبلی برگردید. هرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید.

مصرف بیش از حد:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید و یا به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

هشدارها و احتیاطات:

- موارد نادری از پانکراتیت گزارش شده است که یک فوریت پزشکی می‌باشد و علائمی مانند دردهای شدید و پایدار شکمی (انتشار از ناحیه پستی به شکمی) همراه با تهوع و استفراغ دارد.
- در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت (مانند سایر داروها)، مصرف دارو را قطع و به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید. اینگونه واکنش‌ها می‌توانند موجب بروز راش پوستی، کهیر، تاول، تورم صورت، زیان یا گلو و اشکال در تنفس یا بلع گردند. پزشکتان ممکن است دارویی برای درمان واکنش حساسیتی تجویز نماید و یا قند خون شما را با داروی دیگری کنترل نماید.
- مصرف سیتاگلیپتین همراه با داروهای مانند سولفونیل اوره‌ها (گلی بنکلامید) و انسولین احتمال کاهش قند خون را افزایش می‌دهد لذا رعایت احتیاط در این موارد توصیه می‌گردد.
- این دارو تأثیر قابل توجهی بر رانندگی و کار با ابزارآلات ندارد ولی با توجه گزارش مواردی از سرگیجه و خواب آلودگی، رعایت احتیاط توصیه می‌گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو در کنار اثرات مفید خود دارای یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد. اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی‌کند اما در صورت بروز هر مشکلی به پزشک خود مراجعه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از آن و مشورت با پزشک قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها به‌مراتب کمتر از عوارض عدم مصرف آنها می‌باشد.

- عوارض جانبی شایع (کمتر از ۱ به ۱۰ مورد) هنگام مصرف سیتاگلیپتین با متفورمین: افت قند خون، تهوع، نفخ و استفراغ
- عوارض جانبی ناشایع (کمتر از ۱ به ۱۰۰ مورد) هنگام مصرف سیتاگلیپتین با متفورمین: دل درد، اسهال، یبوست و خواب آلودگی
- تعدادی از بیماران هنگام مصرف همزمان این دارو با متفورمین دچار ناراحتی‌های گوارشی یا سوءهاضمه می‌شوند.

- عوارض جانبی شایع (کمتر از ۱ به ۱۰ مورد) هنگام مصرف سیتاگلیپتین با سولفونیل اوره‌ها: افت قند خون
- عوارض جانبی خیلی شایع (بیشتر از ۱ به ۱۰ مورد) هنگام مصرف سیتاگلیپتین با سولفونیل اوره‌ها و متفورمین: افت قند خون
- عوارض جانبی شایع (کمتر از ۱ به ۱۰ مورد) هنگام مصرف سیتاگلیپتین با سولفونیل اوره‌ها و متفورمین: یبوست
- عوارض جانبی شایع (کمتر از ۱ به ۱۰ مورد) هنگام مصرف سیتاگلیپتین با پیوگلیتازون: نفخ و تورم دست و پا

- عوارض جانبی شایع هنگام مصرف سیتاگلیپتین با پیوگلیتازون و متفورمین: تورم دستها و پا
- عوارض جانبی شایع (کمتر از ۱ به ۱۰ مورد) هنگام مصرف سیتاگلیپتین با انسولین: آنفولانزا
- عوارض جانبی ناشایع (کمتر از ۱ به ۱۰۰ مورد) هنگام مصرف سیتاگلیپتین با انسولین: خشکی دهان
- عوارض جانبی شایع هنگام مصرف سیتاگلیپتین به تنهایی: افت قند خون، سردرد، عفونت دستگاه تنفس فوقانی، آبریزش بینی یا گلودرد، استوارتریت و درد دست و پا
- عوارض جانبی ناشایع هنگام مصرف سیتاگلیپتین به تنهایی: سرگیجه، یبوست و خارش
- عوارض جانبی نادر (کمتر از ۱ به ۱۰۰۰ مورد) هنگام مصرف سیتاگلیپتین به تنهایی: کاهش پلاکت خون

نیازی به نگرانی از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثریت مردم این دارو را بدون هیچ مشکلی مصرف می‌کنند.

عوارض دیگری که در بالا نیامده است ممکن است در برخی از بیماران بروز کند لذا اگر متوجه عوارض جانبی دیگری شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دکتر قاضی غریبی، شماره ۲۹۵، کد پستی ۱۴۱۸۱-۵۳۶۹۵
تلفن رسیدگی به شکایات: ۰۲۱-۳۱۸۸۳۶۱۹ (۰۱۳)
ایمیل: Complaints@sobhandarou.com