



ریلوزان

نام ژئوپلیک: ریلوزان

شکل دارویی: فرقن روکش دار خدادار

حین درمان توصیه می کردد (توسط پزشک) • اگر نارسانی کبدی دارد و یا سطوح آنژمهای کبدی شما غیر طبیعی است، برای تنظیم دوز دارو و یا تغییر درمان با پزشک خود مشورت کنید.

دوز فراموش شده:

اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، از مصرف دوز فراموش شده منصرف شده و سه روزی منظم قبلی برگردید. هرگز دوز دارو را دو برابر نکنید.

صرف بیش از حد:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا نزدیکترین مرکز فوریتنهای پزشکی مراجعه نمایید.

شدادرها و اختیارات:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک خود مشورت کنید:

(الف) تسب: این دارو ممکن است سطح گلوبول سفید خون را کاهش دهد لذا پزشکتان شاید لازم بداند سطح گلوبول سفید خون شما را چک نمایند.

(ب) در صورت بروز زردی پوست بدین یا زد شدن سفیدی چشم، خارش عمومی، احساس ناخوشی و یا خستگی ممکن است پزشکتان به دلیل اختلال بیماری کبدی به صورت سریال از شما آزمایش خون بگیرد.

(ج) سرفه و مشکلات تنفسی ممکن است علاماتی از بیماری یووی باشد اگر حین مصرف دارو احساس سرگیجه و سبکی سر می کنید، از رانندگی و کار با ایزار آلات خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو در کتاب اثبات مفید خود دارای یک سری اثرات ناخواسته می باشد. اگر جه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی کند اما در صورت برخورد هر مشکلی به پزشک خود مراجعه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از آن و مشورت با پزشک قابل پیش بینی و قابل رفع می باشد.

به خاطر داشته باشید که عوارض داروها به مراتب کمتر از عوارض عدم مصرف آنها می باشد.

• عوارض جانبی شایعتر (بین از ۱%): تهوع، خستگی، احساس ناخوشی و افزایش آنژمهای کبدی (ترانس آمیتابها)

• عوارض جانبی با شیوع کمتر (بین ۱ تا ۱%): سرگیجه، خواب آلودگی، سردرد، گرگز و سور مور دهان، افزایش ضربان قلب، درد شکمی، استفراغ، اسهال و درد

• عوارض جانبی ناشایع (بین ۱ تا ۰%): کم خونی، واکنش افزایش حساسیت و التهاب لوزالمعده (بانکرتیت)

نیازی به نگرانی از لیست عوارض دکر شده در مورد این دارو نیست و اکثریت مردم این دارو را بدون هیچ مشکلی مصرف می کنند.

عوارض دیگری که در بیان اینهاست ممکن است در برخی از بیماران بروز کنند لذا اگر متوجه عوارض جانبی دیگری شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

در میان ۳۰ درجه سانتینگراد، دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود. هرگز دارو را پس از گذشتن تاریخ انقضا روی بیلستر یا جعبه دارو مصرف ننمایید.

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره ۴۹۵، کد پستی ۱۴۱۱۸-۵۳۶۹۵

تلفن رسیدگی به شعبات: ۰۳۱۸۸۲۶۱۹

ایمیل: Complaints@sobhandarou.com

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما بسیار سودمند می باشد. اگر به نکتهای نامفهوم برخورد کردید یا به اطلاعات پیشتری در مورد این دارو نیاز دارید با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در تصمیم گیری برای مصرف یک دارو باید خطرات آن در مقابل فایده حاصل از مصرف دارو را باید خطرات آن در موارد رسیدگی برای مصرف دارو را باید در نظر گرفته شوند.

• موارد منع مصرف:

در مورتیکه سایقه هر گونه واکنش غیرعادی یا آرژیک به داروی ریلوزان در ارdes و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزشک خود اطلاع دهید. مواد منع مصرف دارو شامل مواد زیر می باشد:

• بیماری کبدی یا افزایش سطح خونی آنژمهای کبدی بیش از ۳ برابر باشد.

• بارداری یا شیردهی:

• مصرف این دارو در بارداری منوع است، لذا اگر تصمیم به بارداری دارید قبل از مصرف دارو با پزشکان مشورت کنید.

شیردهی:

در صورتی که به کودکتان شیر می دهید هرگز این دارو را مصرف نکنید و همچنین اگر تصمیم به شیر دادن به کودک در حین مصرف این دارو دارد، حتماً با پزشک خود مشورت کنید.

اطفال:

این دارو برای افراد زیر ۱۸ سال توصیه نشده است زیرا اطلاعات لازم جهت این دارو در این سنین در دسترس نمی باشد.

صرف همراه با سایر داروهای:

اگر هم‌مان با این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی یا غذایی را مصرف می کنید یا آخیراً مصرف کرده اید، به پزشک یا داروساز اطلاع دهید. مخصوصاً مهم است که پزشک شما از مصرف داروهای زیر اطلاع داشته باشد: ریفامیلن، امپرازول، کافین، توتولین، آمی تریپتیلین و کینولونها

سایر بیماریها:

حضور سایر بیماریها و مشکلات پزشکی می تواند مصرف ریلوزان را تحت تأثیر قرار دهد. مطمئن شوید که هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود مخصوصاً مواده در ذیل را به پزشک خود اطلاع دهید:

• مشکلات کبدی: زردی پوست بدین ماده سفیدی چشم، خارش عمومی، احساس ناخوشی و خستگی مفرط • مشکلات کلیوی تسب: می تواند به دلیل کاهش تعادل گلوبولهای سفید خون باشد

روش مصرف مناسب این دارو:

• همیشه این دارو را طبق دستور پزشکتان مصرف نمایید و در صورت هر گونه شباهت با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. این دارو را یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا مamil بایش منظم آنژمهای کبدی قیل و