

نام ژنریک: سولیفناسین

شکل دارویی: قرص روکش دار

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما بسیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌ای نامفهوم برخورد کردید یا به اطلاعات بیشتری در مورد این دارو نیاز دارید با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در تصمیم‌گیری برای مصرف یک دارو باید خطرات آن در مقابل فواید حاصل از مصرف دارو سنجیده شود. در مورد سولیفکس موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

موارد منع مصرف:

در صورتی که سابقه هر گونه واکنش غیرعادی یا آلرژیک به داروی سولیفناسین دارید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزشک خود اطلاع دهید. موارد منع مصرف این دارو شامل موارد ذیل می‌باشند:

- واکنش افزایش حساسیت به سولیفناسین یا سایر ترکیبات جانبی دارو • اگر تحت دیالیز کلیوی می‌باشید • ناتوانی در ادرار کردن یا تخلیه کامل مثانه (احتباس ادراری) • مشکلات جدی معده یا روده مانند انبساط حاد و سمی روده بزرگ (از عوارض ثانویه کولیت اولسراتیو)
- میاستنی گراویس (نوعی بیماری عضلانی همراه با ضعف شدید در عضلات) • آب سیاه یا گلوکوم (افزایش فشار داخلی کره چشم همراه با کاهش تدریجی دید) • نارسایی شدید کبدی
- اگر از نارسایی شدید کلیوی یا مشکل متوسط کبدی رنج می‌برید و به طور همزمان تحت درمان با داروهایی هستید که دفع سولیفناسین را از بدن کاهش می‌دهند (مانند کتوکونازول)، بایستی با پزشک یا داروساز خود برای مصرف دارو مشورت کنید.

حاملگی:

برای مصرف دارو در دوره بارداری با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. پزشک دارو را با ارزیابی مزایا و مضرات احتمالی تجویز می‌نماید.

شیردهی:

این دارو در شیر مادر ترشح می‌گردد، لذا از مصرف آن در دوره بارداری خودداری نمایید.

اطفال:

مصرف این دارو در کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ (به دلیل عدم اثبات قطعی ایمنی و اثربخشی) توصیه نشده است.

مصرف همراه با سایر داروها:

اگر همزمان با این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی یا غذایی را مصرف می‌کنید یا اخیراً مصرف کرده‌اید، به پزشک یا داروساز اطلاع دهید. مخصوصاً مهم است که پزشک شما از مصرف داروهای زیر اطلاع داشته باشد:

- سایر داروهای آنتی کولینرژیک سبب افزایش اثرات و عوارض جانبی سولیفناسین می‌شوند.
- داروهای کولینرژیک سبب کاهش اثربخشی این دارو می‌گردند. • داروهای متوکلوپرامید، سیزاپراید و دومپریدون با افزایش حرکات دودی دستگاه گوارش از اثرات سولیفناسین می‌کاهند. • داروهای کتوکونازول، ریتوناویر، نلفیناور، ایتراکونازول، وراپامیل و دیلتیازم سبب کاهش متابولیسم و دفع سولیفناسین از بدن می‌گردند. • داروهای ریفامین، فنیتوئین و کاربامازین سبب افزایش متابولیسم و دفع سولیفناسین از بدن می‌گردند. • داروهای بیسی فسفونات مانند آلندرونیت می‌توانند سبب التهاب مری گردند (ازوفاجیت).

سایر بیماریها:

حضور سایر بیماریها و مشکلات پزشکی می‌تواند مصرف سولیفناسین را تحت تأثیر قرار دهد. مطمئن شوید که هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود مخصوصاً موارد آمده در ذیل را به پزشک خود اطلاع دهید:

- احتباس ادراری به دلیل انسداد مثانه و یا اشکال در دفع ادرار • انسداد گوارشی یا یبوست
- بیماری های گوارشی که حرکات معده و روده را کند می‌کنند • نارسایی شدید کلیه
- نارسایی متوسط کبد • قفق معده (هیاتال) یا سوزش سردل • اختلال عصبی (نوروپاتی اتونوم) • مشکلات قلبی که بر روی ریتم اثر می‌گذاردن (طولانی شدن فاصله کیو تی در نوار الکتروکاردیوگرام قلب)

روش مصرف مناسب این دارو:

• دارو را دقیقاً طبق دستور پزشکتان مصرف نمایید و در صورت هر گونه شبهه با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. • این دارو را با یک لیوان آب میل نمایید. • این دارو را می‌توانید همراه با غذا و یا با معده خالی میل نمایید. • از خوردن و یا جویدن قرص خودداری کنید. • از تغییر دوز دارو بدون مشورت با پزشک خودداری کنید.

دوز فراموشی شده:

اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، آنرا مصرف نمایید. با اینحال اگر نزدیک زمان دوز بعدی به یاد آوردید از مصرف دوز فراموش شده منصرف شوید و به رژیم منظم قبلی برگردید. هرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید.

مصرف بیش از حد:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. مصرف بیش از حد دارو می‌تواند منجر به عوارضی مانند سردرد، سرگیجه، خشکی دهان، خواب آلودگی، تاری دید، توم، تحریک پذیری، تشنج، تنگی نفس، افزایش ضربان قلب، احتباس ادراری و گشادی مردمک چشم گردد.

هشدارها و احتیاطات:

• در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت (آنژیوادم)، مصرف دارو را متوقف و سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید. علائم آنژیوادم شامل تورم زبان، گلو، حنجره، تنگی نفس و انسداد مجاری تنفسی که تهدید کننده حیات می‌باشد.

• این دارو حاوی لاکتوز می‌باشد، لذا اگر سابقه عدم تحمل لاکتوز دارید، قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

• این دارو ممکن است سبب تاری دید، خواب آلودگی و یا خستگی گردد. در صورت بروز این علائم از رانندگی و کار با ابزارآلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

• مصرف داروهای آنتی کولینرژیک مانند سولیفناسین در محیط های گرم ممکن است سبب کاهش تعریق و گرمزدگی گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو در کنار اثرات مفید خود دارای یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد. اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی‌کند اما در صورت بروز هر مشکلی به پزشک خود مراجعه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از آن و مشورت با پزشک قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها به‌مراتب کمتر از عوارض عدم مصرف آنها می‌باشد.

• عوارض جانبی با شیوع بیش از یک به ده مورد: خشکی دهان

• عوارض جانبی با شیوع کمتر از یک به ده مورد: یبوست، تهوع، دل درد، احساس پری شکم، سوزش سر دل، آروغ زدن و سوء هاضمه

• عوارض جانبی با شیوع کمتر از یک به صد مورد: عفونت ادراری، خواب آلودگی، تضعیف حس چشایی، خشکی ملتحمه چشم، خشکی گلو، ریفلاکس معده به مری، خشکی پوست، اشکال در دفع ادرار، تورم اندام ها (خیز یا ادم) و خستگی

نیازی به نگرانی از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثریت مردم این دارو را بدون هیچ مشکلی مصرف می‌کنند.

عوارض دیگری که در بالا نامیده است ممکن است در برخی از بیماران بروز کنند لذا اگر متوجه عوارض جانبی دیگری شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره ۲۹۵، پست کد ۵۳۶۹۵-۱۴۱۱۸

تلفن رسیدگی به شکایات: ۳۱۸۸۳۶۹۹ (۰۱۲)

ایمیل: Complaints@sobhandarou.com