



تتراپاپیک

نام ژئریک: تتراسیکلین

شکل داروبی: پماد موضعی

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما بسیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌ای نامفهوم برخود کردید یا به اطلاعات بیشتری در مورد این دارو نیاز دارید با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری فلی شما تجوییز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در تسمیم‌گیری برای مصرف یک دارو باید خطرات آن در مقابل فواید حاصل از مصرف دارو سنجیده شود. در مورد پماد تتراپاپیک موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

موارد منع مصرف:

در صورتیکه هر گونه واکنش غیرعادی یا آلرژیک به تتراسیکلین‌ها و یا سایر ترکیبات این دارو دارید، از مصرف دارو خودداری نمایید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر دارو و یا ماده دیگری مانند غذانها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزشک خود اطلاع دهید.

حامگی:

قبل از مصرف دارو در دوره بارداری با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

شیردهی:

اطلاعات کافی در مورد این دارو در دوره شیردهی صورت نگرفته است لذا قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

اطفال:

صرف این دارو برای سنین زیر ۱۱ سال توصیه نشده است.

صرف همراه با سایر داروها:

اگر هم‌زمان با این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی و یا سایر داروهای موضعی یا آرایشی و بهداشتی را مصرف کنید یا به تازگی مصرف نموده‌اید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

روش مصرف مناسب این دارو:

همیشه این دارو را طبق دستور پزشک خود مصرف و در صورت هر گونه شبهه با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

این دارو فقط برای استعمال خارجی (بوستی) می‌باشد و از تماس آن با

چشم‌ها و اطراف آن خودداری نمایید.

برای مصرف مناسب دارو، مقداری از پماد را به صورت یک لایه نازک بر روی پوست ناحیه مبتلا به آرامی بمالید و در خانمه دست خود را بشویید مگر اینکه دستان نیز جز ناحیه مبتلا باشد.

روش مصرف معمول این دارو یک یا دو بار در روز می‌باشد.

دوره درمان را طبق دستور پزشک خود تکمیل کنید.

در صورت عدم بهبودی (طی یک هفتة) یا تشدید عالائم با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

دوز فراموش شده:

اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید، با این حال اگر نزدیک زمان دوز بعدی به یاد آوردید، از مصرف دوز فراموش شده منصرف شوید و به رُیم منظم قبلى برگردید. هرگز به جهت جبران دوز دارو را دو برابر نکنید.

صرف بیش از حد:

در صورت مصرف موضعی بیش از مقدار توصیه شده، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. اگر سهوا مقدار زیادی از این دارو را بعلییدید، به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه نمایید.

هشدارها و احتیاطات:

در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت، مصرف دارو را قطع و با پزشک خود مشورت نمایید.

از مصرف این دارو در زخم‌های عمیق، سوراخ‌شده‌گی‌ها و سوختگی‌های جدی بدون دستور پزشک خودداری نمایید.

از تماس این دارو با چشم‌ها یا اطراف آن خودداری نمایید.

- سایر داروهای موضعی را که ممکن است سبب تشدید التهاب و یا حساسیت به نور گردند، با یک ساعت فاصله زمانی مصرف نمایید.

مصرف موضعی این دارو بدون پوشش ممکن است سبب تغییر رنگ باش گردد.

عارضات جانبی:

هر دارو در کنار اثرات مفید خود دارای یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد.

اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی‌کند اما در صورت بروز هر مشکلی به پزشک خود مراجعه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از

آن و مشورت با پزشک قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها بمراتب کمتر از عوارض عدم مصرف آنها می‌باشد.

• عوارض جانبی: درد، قرمزی، تورم و یا سایر علائم التهابی که پس از مصرف ایجاد شده باشد (خشکی، پوسته پوسته شدن، احساس سوزش و یا گریدگی و خارش)

در صورت قطع مصرف، این عوارض باستی ناپذید شوند ولی چنانچه ادامه

پیدا کرد با پزشک و داروساز خود مشورت نمایید. در صورت بروز هر گونه عارضه جدی خارج از لیست بالا با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

نیازی به نگرانی از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثریت مردم این دارو را بدون هیچ مشکلی مصرف می‌کنند.

شرایط نگهداری:

دارو در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ‌زدگی محافظت شود. همچنین دور از دید و دسترس اطفال قرار گیرد.

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره ۲۹۵ ، کد پستی ۵۳۶۹۵-۱۴۱۱۸

تلفن رسیدگی به شکایات: (۰۱۳) ۳۱۸۸۳۶۱۹

ایمیل: Complaints@sobhandarou.com