

نام ژنیکه: تیکارگور

شکل دارویی: قرص روکش دار

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما بسیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌ای نامفهوم برخورد کردید یا به اطلاعات بیشتری در مورد این دارو نیاز دارید یا پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در تصمیم گیری برای مصرف یک دارو باید خطرات آن در مقابل فواید حاصل از مصرف دارو سنجیده شود. در مورد تیکرل موارد ذیل باید در نظر گرفته شود:

موارد منع مصرف:

در صورتیکه سابقه هر گونه واکنش غیرعادی با آگزیک به داروی تیکارگور دارید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزشک خود اطلاع دهید. موارد منع مصرف شامل: • واکنش افزایش حساسیت به تیکارگور و یا سایر محتویات دارو • خونریزی فعال • سنگه مغزی (همور آژیک یا خونریزی دهنده) • بیماری کبدی شدید • مصرف همزمان با داروهای زیر: کتوکونازول (ضد قارچ)، کلاریترومایسین (آنتی بیوتیک)، نفازدون (ضد افسردگی)، ریتوناویر و آتازناویر (ضد ویروس جهت درمان ایدز)

حاملگی:

در صورت بارداری و یا اقدام به آن از مصرف این دارو خودداری نمایید. همچنین بانوانی که تحت درمان با این دارو هستند، از روشهای مناسب جهت جلوگیری از بارداری استفاده نمایند.

شیردهی:

در دوره شیردهی قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید، زیرا پزشکتان با توجه به مزایا و مضرات آن تصمیم خواهد گرفت.

اطفال:

مصرف این دارو برای سنین زیر ۱۸ سال توصیه نشده است.

مصرف همراه با سایر داروها:

اگر همزمان با این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه گاهی یا مکمل ویتامینی یا غذایی را مصرف می‌کنید یا اخیراً مصرف کرده اید، به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.

مخصوصاً مهم است که پزشک شما از مصرف داروهای زیر اطلاع داشته باشد:

- مصرف سیمو استاتین و لوواستاتین با دوز ۴۰ میلی‌گرم برای کاهش کلسترول
- ریفامپین (آنتی بیوتیک) • فتی‌توئین، کاربامازپین و فنوباریتال (ضد صرع)
- دیگوکسین (نارسایی قلب) • سیکلوسپورین (تضعیف کننده سیستم ایمنی) • کینیدین و دینیدینازم (درمان ریتم قلبی غیر نرمال) • مهار کننده گیرنده بتا و وراپامیل (درمان افزایش فشار خون) • ضد انعقادها مانند وارفارین (ریسک بروز خونریزی افزایش می‌یابد) • ضد التهاب های غیر استروئیدی مانند ایبوپروفن و ناپروکسن (ریسک بروز خونریزی افزایش می‌یابد)
- مهار کننده انتخابی بازجذب سروتونین از دسته ضد افسردگی مانند پاروکستین، سرتراوین و سیتالوپرام • سبزی‌آبراید (درمان سوزش سردل)
- آلکالوئیدهای ارگوکاتامین

سایر بیماری‌ها:

حضور سایر بیماریها و مشکلات پزشکی می تواند مصرف تیکارگور را تحت تاثیر قرار دهد. مطمئن شوید که هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود مخصوصاً موارد آمده در ذیل را به پزشک خود اطلاع دهید: • آسیب جدی (افزایش ریسک بروز خونریزی) • جراحی (مانند جراحی دهان و دندان که احتمال ریسک خونریزی را افزایش می‌دهد) • مشکلات انعقادی (افزایش ریسک بروز خونریزی) • خونریزی گوارشی (افزایش ریسک بروز خونریزی) • افت ضربان قلب یا برادی‌کاردی (ضربان قلب زیر ۶۰ بار در دقیقه) • وجود ضربان‌ساز (pacemaker) • مشکلات تنفسی و یا آسم • مشکلات کبدی • وجود افزایش سطح اسید اوریک خون و یا سابقه آن

روش مصرف مناسب این دارو:

همیشه این دارو را دقیقاً طبق دستور پزشک خود مصرف کنید و در صورت عدم اطمینان با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. این دارو را میتوان همراه با غذا و یا بدون آن مصرف نمود. همیشه این دارو را با یک لیوان آب میل نمایید و در صورت بروز مشکل در بلع، می‌توان دارو را خرد کرده و با یک لیوان آب مخلوط نموده و سپس میل نمود.

همیشه دوره درمانی این دارو را رعایت نموده و بدون دستور پزشک مصرف دارو را قطع ننمایید. این دارو معمولاً با سایر داروهای مؤثر بر لخته خون مانند استیل سالیسیلیک اسید (ASA) تجویز می‌شود.

دوز فراموش شده:

اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، از مصرف دوز فراموش شده منصرف شده و به رژیم منظم قبلی برگردید همچنین هرگز دوز دارو را برای جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید.

مصرف بیش از حد:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید، زیرا ریسک بروز خونریزی افزایش می‌یابد. همچنین هنگام مراجعه داروی مصرفی را نیز همراه خود داشته‌باشید.

هشدارها و احتیاطات:

- در صورت بروز مشکلات زیر سریعاً جهت درمان فوری به پزشک مراجعه نمایید:
- خونریزی مغزی و یا داخل جمجمه که ممکن است منجر به سنگه مغزی گردد. علائم این مشکل شامل موارد زیر می‌باشد:
- گرختی و یا ضعف دستها، پاها و یا صورت، گیجی ناگهانی و یا اشکال در تکلم و ادراک، اشکال ناگهانی در راه رفتن و یا تعادل، سرگیجه و سردرد ناگهانی
- علائم خونریزی شامل موارد زیر می‌باشد:
- خونریزی شدید و یا غیر قابل کنترل، خونریزی ارادری غیر قابل توجیه و یا طول کشیده، استفراغ خونی (خون روشن و یا تیره)، مدفوع خونی و یا قیری شکل، سرخه خونی
- غش کردن (fainting) که به دلیل کاهش موقتی سطح هوشیاری و یا افت ناگهانی جریان خون بروز می‌نماید.
- در صورت جراحی (مانند جراحی دهان و دندان)، مصرف دارو ۷ روز قبل از عمل باید تحت نظر پزشک قطع گردد.
- هنگام رانندگی و کار با ابزار آلات در زمان مصرف این دارو، در صورت بروز سرگیجه و یا گیجی دقت لازم را به عمل آورید.

عوارض جانبی:

هر دارو در کنار اثرات مفید خود دارای یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد. اگر چه تمام این اثرات اتفاقی است در یک فرد بروز نمی‌کند اما در صورت بروز هر مشکلی به پزشک خود مراجعه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از آن و مشورت با پزشک قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها به مراتب کمتر از عوارض عدم مصرف آنها می‌باشد.

- عوارض جانبی با شیوع بیش از یک به ده: افزایش سطح اسید اوریک خون، خونریزی ناشی از مشکلات خونی
- عوارض جانبی با شیوع کمتر از یک به ده: کبودی، سردرد، سرگیجه، اسهال، سوزش دهان، تهوع، بیخوابی، راش پوستی، خارش، درد و یا تورم مفاصل (علائم احتمالی بروز نقرس)، سبکی سر، خونریزی بعد از جراحی، بریدگی و یا زخم، خونریزی ناشی از زخمهای گوارشی، خونریزی از لثه
- عوارض جانبی با شیوع کمتر از یک به ۱۰۰: واکنش افزایش حساسیتی (مانند راش، خارش و یا تورم صورت، لبها و یا زبان)، گیجی، مشکلات دید، خونریزی واژینال، خونریزی مفاصل و یا عضلات، خونریزی گوش، خونریزی داخلی (همراه با سرگیجه و سبکی سر می‌باشد)

نیازی به نگرانی از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثریت مردم این دارو را بدون هیچ مشکلی مصرف می‌کنند. عوارض دیگری که در بالا نیامده است ممکن است در برخی از بیماران بروز کنند لذا اگر متوجه عوارض جانبی دیگری شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و دور از دید و دسترسی اطفال نگهداری شود.

دفتر مرکزی:

تهران - خ دکتر ظاهری غربی شماره ۹۵ کد پستی: ۱۴۱۱۸-۵۳۶۹۵
تلفن رسیدگی به شکایات: ۰۱۳۳۱۸۸۳۶۱۹ (۰۱۳۳)

ایمیل: Compliants@sobhandarou.com

